

Ocrelizumab

Workflow-Tabelle
Stand Oktober 2026

	Vor Therapiestart										Während der Therapie						
	Vorbehandlung mit										vor jeder Infusion	zwischen der 1. und 2. Infusion im ersten Behandlungszyklus	während der Infusion	nach der Infusion	nach 1 Monat	vierteljährlich	halbjährlich
	Naive Patienten, Interferon-beta, Glatirameracetat, Dimethylfumarat, Diroximelfumarat	Teriflunomid	Fingolimod, Ozanimod, Siponimod, Ponesimod	Natalizumab, Natalizumab-Biosimilar	Mitoxantron, Azathioprin, Methotrexat, Ciclosporin A, Cyclophosphamid	Cladribin	Rituxumab, Ublituximab	Ofatumumab	Alentuzumab	Studienmedikation	Zusätzliche Gabe von Immuntherapeutika sowie Chemotherapeutika neben Ocrelizumab streng kontraindiziert. Behandlung von Schüben unter Ocrelizumab leitliniengerecht (inklusive eventuell notwendiger Schubeskala-tionstherapie, z. B. Plasmapherese)						
Wartezeiten	keine ¹	≈ 4 Wo ^{1,2}	≈ 4 Wo ^{1,13}	≈ 6-8 Wo ¹	≈ 3 Mo ^{1,3}	≈ 6 Mo ¹	≈ 6 Mo ¹	≈ 4 Wo ¹	≈ 6-12 Mo ¹	≈ 5 Plasma HWZ ^{1,*}							
» Methylpredinsolon 100 mg intravenös											✓						
» H1- + H2-Blockade (z. B. Dimetinden und Ranitidin)											✓		✓				
» Behandlung mit Antipyretika											✓		✓				
» Dokumentation Vitalparameter alle 0,5 h											✓		✓				
» Überwachung nach Beendigung Infusion (≈1h)														✓			
» Therapeutika und geschultes Personal zur Behandlung anaphylaktischer Reaktionen											✓		✓	✓			
Klinische Untersuchung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓ ⁴	
» Labor																	
Blutbild inkl. Differenzialblutbild, GOT, GPT, GGT, Bilirubin	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	✓ ⁶	✓	✓	✓ ⁷	✓	✓	✓				✓	
Gesamt-IgG im Serum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓ ⁸
Leukozyten-Subpopulationen ⁹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	
CRP, Urinstatus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Schwangerschaftstest (F)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁷	✓	✓	✓	✓	✓						
» Infektiologie																	
Hepatitis-B- und -C-Serologie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
HIV-Serologie ¹⁰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
Tbc-Test ¹¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
VZV-Serologie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
JC-Virus Antikörperstatus				✓													
Überprüfung Impfstatus, ggf. Auffrischung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
» Funktionsdiagnostik + Bildgebung																	
MRT des Schädels	✓	✓	✓	✓ ¹²	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
Auswaschung		✓															
Patientenaufklärung mit schriftlicher Einwilligung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							

Die angegebenen Untergrenzen beziehen sich auf den Wechsel bei Patienten mit Krankheitsaktivität oder zu erwartender hoher Krankheitsaktivität.

¹ Bzw. bis zur Remission therapiespezifischer Effekte

² Wenn Teriflunomid aktiv durch Colestyramin eliminiert wurde

³ bei Mitoxantron: Echokardiographie vor Therapiebeginn mit Ocrelizumab

⁴ Mind. 1x jährl. EDSS-Erhebung

⁵ Bei Mitoxantron: Laborkontrollen auch hinsichtlich Anzeichen der Ausbildung einer Akuten Myeloischen Leukämie

⁶ Über mind. 5 Jahre nach Therapieende

⁷ Pflichtkontrolle Thrombozyten und Kreatinin bis zu 4 Jahre nach letzter Alentuzumab-Infusion

⁸ IgG obligat, IgM und IgA fakultativ

⁹ CD4+ -T-Zellen, CD8+ -T-Zellen, NK-Zellen, insbesondere CD19+ - und / oder CD20+ -B-Zellen

¹⁰ Separate schriftliche Einverständniserklärung des Patienten erforderlich

¹¹ Bei Verdacht auf Tbc in der Vorgeschichte oder erhöhtem individuellem Risiko. Bei positivem Testergebnis: Abklärung einer Tbc-Reaktivierung mittels Röntgen-Thorax u. w. Bei negativem Testergebnis:

HALBJÄHRLICHE Wiederholung der Testung

¹² inklusive hochsensitive FLAIR-Sequenz

¹³ Abstand bei Siponimod bzw. Ponesimod kann kürzer sein (1-2 Wochen).

* Plasmahalbwertszeiten